



スケトウダラ（日本海北部系群）①

スケトウダラは北太平洋に広く生息し、本系群はこのうち日本海の東側に分布する群である。本系群の漁獲量や資源量等は漁期年（4月～翌年3月）の数値を示す。




図1 分布域

分布の中心と主産卵場は日本海の北海道沿岸と考えられる。




図2 漁獲量の推移

漁獲量は1993年漁期以降減少傾向で推移し、2015～2022年漁期には0.5万～0.6万トンの範囲であった。TACの増加に伴い2024年漁期の漁獲量は1.1万トンに増加したが、2025年漁期は0.8万トンに減少した。




図3 年齢別漁獲尾数の推移（右上は2016年漁期以降の拡大）

1990年漁期前後の漁獲量が多かった時期は3～5歳魚が漁獲の大部分を占めていたが、1997年漁期以降3～5歳魚の割合は減少した。2020年漁期以降は2012、2015、2016、2018、2019、2021、2022年級群が漁獲物の主体であった。

スケトウダラ（日本海北部系群）②




図4 親魚量指標値の推移

産卵親魚分布調査（調査船調査）から得られた10月時点の親魚現存量をコホート解析における親魚量のチューニング指標値とした。2025年漁期の親魚現存量は13.1万トンと推定され、前年から57%に減少した。

1990年代後半は檜山・渡島など南部に多く分布していたが、近年は宗谷・留萌など北部に多く分布しており、資源構造が変化している。

注：2002、2012年漁期は荒天により欠測




図5 加入量指標値の推移

仔稚魚分布調査および未成魚分布調査（共に調査船調査）から得られた4月時点の0歳（上図）および8～9月時点の1歳（下図）の現存尾数をコホート解析における加入量のチューニング指標値とした。2026年漁期以降に加入する2024年級群以降の0歳現存尾数も高い値となっているが、近年は仔稚魚も北部に偏って分布しており、オホーツク海への流出が懸念される。

スケトウダラ（日本海北部系群）③




図6 資源量と親魚量の推移

本系群は漁獲対象となるのが2歳以降であるため、2歳魚以上の資源量を示す。近年は、豊度が高い2012、2015、2016、2018、2019、2021、2022、2023年級群が発生したことによって、資源量は2014年漁期以降、親魚量は2016年漁期以降増加傾向にある。2025年漁期の資源量は33.7万トンと前年漁期から増加し、親魚量は15.7万トンであった。




図7 年齢別資源尾数の推移

資源尾数は1992年漁期以降減少傾向を示したが、近年は豊度が高い年級群が2歳で加入した年に増加している。2025年漁期の資源尾数は2019、2021、2022、2023年級群が大半を占めた。2006年級群以降で2歳時点の資源尾数が0.5億尾以下の低い豊度は2007～2009および2011年級群のみであった。なお、加入量は各年の2歳魚の資源尾数である。

スケトウダラ（日本海北部系群）④




図8 再生産関係

1980～2023年漁期の親魚量と1982～2025年漁期の加入量に対し、ホッカー・スティック型再生産関係（青太線）を適用した。図中の青点線は、再生産関係の下で、加入量の90%が含まれると期待される範囲である。直近5年間を赤印、最初の1982年漁期を黄印とした。図中の数字は2歳魚が加入した漁期年を示す。




図9 管理基準値

最大持続生産量（MSY）を実現する親魚量（SBmsy）は29.3万トンと算定される。目標管理基準値はSBmsy、限界管理基準値はMSYの60%の漁獲量が得られる親魚量、禁漁水準はMSYの10%の漁獲量が得られる親魚量である。

目標管理基準値	限界管理基準値	禁漁水準	2025年漁期の親魚量	MSY	2025年漁期の漁獲量
29.3万トン	12.2万トン	1.7万トン	15.7万トン	4.0万トン	0.8万トン

スケトウダラ（日本海北部系群）⑤




図10 神戸プロット（神戸チャート）

親魚量（SB）は、1990年漁期を除き最大持続生産量（MSY）を実現する親魚量（SBmsy）を下回っており、2025年漁期の親魚量はSBmsyの0.54倍である。

漁獲圧（F）は、2017年漁期以降、SBmsyを維持する漁獲圧（Fmsy）を下回っており、2025年漁期の漁獲圧はFmsyの0.47倍である。





図11 漁獲シナリオ

（上図：縦軸は漁獲圧、下図：縦軸は漁獲量）

漁獲シナリオ（調整係数である $\beta=0.9$ ）を黒い太線で示す。下図の漁獲量については、平均的な年齢組成の場合の漁獲量を示した。

スケトウダラ（日本海北部系群）⑥

将来の親魚量（万トン）



将来の漁獲量（万トン）




図12 漁獲シナリオの下での親魚量と漁獲量の将来予測（現状の漁獲圧は参考）

漁獲シナリオ（ $\beta=0.9$ ）に基づく漁獲を継続した場合の将来予測結果を示す。

中長期的には親魚量および漁獲量はそれぞれ増加して、親魚量の平均値はSBmsyに、漁獲量の平均値はMSYに近づく。

調査船調査により2024年級群以降の豊度が高いと推定されていることから、今後も資源は増加すると予測される。

■ 漁獲シナリオに基づく将来予測
（ $\beta=0.9$ ）

■ 現状の漁獲圧に基づく将来予測

実線は予測結果の平均値を、網掛けは予測結果（1万回のシミュレーションを試行）の90%が含まれる範囲を示す。

----- MSY

----- 目標管理基準値

----- 限界管理基準値

..... 禁漁水準

スケトウダラ（日本海北部系群）⑦

表1. 将来の平均親魚量（万トン）

β	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.0	18.4		28.7	30.6	30.3	29.9	30.5	31.5	32.4	32.9	32.9	51%
0.9		23.4	28.9	31.1	31.0	30.8	31.4	32.6	33.5	34.1	34.2	55%
0.8			29.2	31.6	31.8	31.7	32.5	33.7	34.7	35.4	35.6	59%
現状の漁獲圧			29.8	32.9	33.6	34.0	35.2	36.6	37.9	38.7	39.3	68%

表2. 将来の平均漁獲量（万トン）

β	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.0	1.2	3.1	3.6	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
0.9		2.8	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2
0.8		2.5	3.0	3.3	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
現状の漁獲圧		1.8	2.2	2.5	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2

漁獲シナリオ（ $\beta=0.9$ 、赤枠）に基づき漁獲した場合の平均親魚量と平均漁獲量を示す。2026年漁期の漁獲量は、TACと2023～2025年漁期の平均TAC消化率の積により仮定した。
この漁獲シナリオに従うと、2027年漁期の平均漁獲量は2.8万トン、2036年漁期に親魚量が目標管理基準値を上回る確率は55%と予測される。併せて、 β を0.8～1.0の範囲で変更した場合と現状の漁獲圧（2023～2025年漁期の平均： $\beta=0.56$ に相当）の場合の将来予測結果も示した。

表3. ABC要約表

2027年漁期のABC (万トン)	2027年漁期の親魚量予測平均値 (万トン)	現状の漁獲圧に対する比 (F/F2025)	2027年漁期の漁獲割合 (%)
2.8	23.4	0.47	6

注：表の値は今後の資源評価により更新される。