

令和7年 九州海域における赤潮発生状況（11月分まで）

県名：まとめ

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数 (cells/ml) | 最大面積 (km ²) |
|--------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------------|------------------|---------|-------|------------------|-------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| R6. 10 | NS-23 | 10/23 ～ 1/8 | (78日間) | 九州西部(その他(北)) | 南九十九島周辺 | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | sp. (笠沙型) | 無 | 不明 | 6,225 | 不明 |
| R6. 12 | SA-10 | 12/9 ～ 1/16 | (39日間) | 九州西部(有明海) | 川副町地先から鹿島市地先 | 渦鞭毛藻 | <i>Akashiwo</i> | <i>sanguinea</i> | 有 | 33 | 390 | 不明 |
| R6. 12 | F0-12 | 12/25 ～ 4/28 | (125日間) | 九州西部(有明海) | 福岡県海域 | 珪藻 | <i>Eucampia</i> | <i>zodiacus</i> | 有 | 45 | 3,070 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 有 | | 26,550 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 有 | | 3,740 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Rhizosolenia</i> | <i>setigera</i> | 有 | | 60 | |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Akashiwo</i> | <i>sanguinea</i> | 有 | | 800 | |
| R7. 1 | KM-01 | 1/8 ～ 3/28 | (80日間) | 九州西部(有明海) | 熊本市港地先～宇土市赤瀬沖 | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 有 | 42,36 | 14,000 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Eucampia</i> | <i>zodiacus</i> | 有 | | 1,700 | |
| | SA-01 | 1/16 ～ 4/28 | (103日間) | 九州西部(有明海) | 筑後川河口域から太良町地先 | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 有 | 44 | 6,540 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Eucampia</i> | <i>zodiacus</i> | 有 | | 3,222 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 有 | | 10,544 | |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|-------|-------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|------------|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| R7. 3 | KM-02 | 3/27～4/18 | (23日間) | 九州西部(八代海) | 八代海湾奥部～球磨川河口 | 珪藻 | Eucampia | zodiacus | 無 | 42, 51 | 850 | 不明 |
| R7. 4 | YG-01 | 4/12～4/12 | (1日間) | 九州北部(その他) | 下関外海～萩沖 | 渦鞭毛藻 | Noctiluca | scintillans | 無 | 不明 | 不明 | 不明 |
| | KG-01 | 4/19～5/30 | (42日間) | 離島(甑島) | 薩摩川内市上甑町浦内湾 | 渦鞭毛藻 | Cochlodinium | polykrikoides | 不明 | 不明 | 1, 505 | 不明 |
| | YG-02 | 4/21～5/7 | (17日間) | 九州北部(その他) | 油谷湾 | 渦鞭毛藻 | Karenia | digitata | 無 | 不明 | 723 | 不明 |
| | KM-03 | 4/21～5/12 | (22日間) | 九州西部(八代海) | 八代市鏡町地先、天草市久玉地先 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 不明 | 16, 000 | 不明 |
| | KM-04 | 4/23～5/27 | (35日間) | 九州西部(有明海) | 荒尾市地先～熊本市河内地先 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 42, 51 | 24, 000 | 不明 |
| | YG-03 | 4/24～4/24 | (1日間) | 九州北部(その他) | 仙崎湾 | 渦鞭毛藻 | Gymnodinium | sp. | 無 | 不明 | 29, 400 | 不明 |
| R7. 5 | KM-05 | 5/14～6/4 | (22日間) | 九州西部(八代海) | 宇城市大岳地先～八代市鏡町地先、上天草市龍ヶ岳地先、天草市嵐口地先 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 33, 42, 51 | 130, 000 | 不明 |
| | F0-01 | 5/15～5/20 | (6日間) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾東～中部沿岸海域 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 36 | 40, 900 | 不明 |
| | F0-02 | 5/15～5/27 | (13日間) | 九州西部(有明海) | 福岡県海域 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 45 | 15, 020 | 不明 |
| | SA-02 | 5/15～5/27 | (13日間) | 九州西部(有明海) | 白石町から太良町地先 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 32 | 10, 550 | 不明 |
| | MZ-01 | 5/19～5/26 | (8日間) | 九州東部(北部) | 北浦湾周辺海域 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 不明 | 79, 000 | 不明 |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|-------|-------|-----------|--------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|-------|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| | KG-02 | 5/20～5/28 | (9日間) | 九州南部(鹿児島湾) | 鹿児島湾奥 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 不明 | 115,000 | 不明 |
| | NS-01 | 5/21～5/26 | (6日間) | 離島(壱岐) | 壱岐市芦辺町沿岸 | 渦鞭毛藻 | Noctiluca | scintillans | 無 | 13 | 305 | 不明 |
| | F0-03 | 5/29～6/2 | (5日間) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾東～中部沿岸海域 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 27 | 191,800 | 不明 |
| R7. 6 | KM-06 | 6/2～9/1 | (92日間) | 九州西部(有明海) | 有明海 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 42,51 | 24,000 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | Chaetoceros | spp. | 無 | | 20,000 | |
| | SA-03 | 6/3～6/12 | (10日間) | 九州西部(有明海) | 白石町から太良町地先 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 45 | 12,300 | 不明 |
| | KM-07 | 6/4～7/10 | (37日間) | 九州西部(八代海) | 宇城市戸馳島東～八代市大築島北 | 珪藻 | Skeletonema | spp. | 無 | 42,51 | 26,000 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | Chaetoceros | spp. | 無 | | 9,300 | |
| | F0-04 | 6/9～6/18 | (10日間) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾中南部沿岸海域 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 有 | 24,33 | 27,300 | 不明 |
| | MZ-02 | 6/10～6/12 | (3日間) | 九州東部(北部) | 北浦湾周辺海域 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 不明 | 13,000 | 不明 |
| | NS-02 | 6/12～6/26 | (15日間) | 離島(五島) | 五島市玉之浦湾 | 渦鞭毛藻 | Cochlodinium | polykrikoides | 無 | 不明 | 397 | 不明 |
| | KM-08 | 6/16～6/30 | (15日間) | 九州西部(八代海) | 天草市久玉地先 | リトストマ(織毛虫) | Mesodinium | rubrum | 無 | 不明 | 4,800 | 不明 |
| | SA-04 | 6/17～6/25 | (9日間) | 九州西部(有明海) | 白石町から竹崎沖 | 渦鞭毛藻 | Heterocapsa | spp. | 無 | 33 | 6,100 | 不明 |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------------------|------------|-------------|------------|---------|----|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| | SA-05 | 6/17～6/25 | (9日間) | 九州西部(有明海) | 白石町から太良町地先 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 33 | 6,100 | 不明 |
| | KM-09 | 6/17～8/12 | (57日間) | 九州西部(八代海) | 八代海 | 渦鞭毛藻 | Gonyaulax | polygramma | 無 | 16 | 34,000 | 不明 |
| | F0-05 | 6/19～6/25 | (7日間) | 九州西部(有明海) | 福岡県海域 | ラフィド藻 | Heterosigma | akashiwo | 無 | 15 | 16,480 | 不明 |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | Gyrodinium | spp. | 無 | | 10,360 | |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | Heterocapsa | spp. | 無 | | 7,380 | |
| | NS-03 | 6/23～7/29 | (37日間) | 九州西部(橘湾) | 橘湾中央部及び長崎市網場～諫早市～雲仙市千々石地先 | 渦鞭毛藻 | Gonyaulax | polygramma | 無 | 15 | 9,300 | 不明 |
| | SA-06 | 6/30～7/15 | (16日間) | 九州北部(その他) | 唐津湾 | ラフィド藻 | Chattonella | antiqua | 無 | 33 | 1,440 | 不明 |
| | NS-04 | 7/2～7/16 | (15日間) | 九州西部(大村湾) | 佐世保湾 | 渦鞭毛藻 | Karenia | mikimotoi | 無 | 33 | 1,460 | 不明 |
| | KM-10 | 7/4～8/5 | (33日間) | 九州西部(その他(南)) | 天草市魚貫崎沖 | 渦鞭毛藻 | Gonyaulax | polygramma | 無 | 不明 | 32,000 | 不明 |
| | NS-05 | 7/9～8/6 | (29日間) | 九州西部(その他(北)) | 佐世保市、鹿子前～白馬地先、九十九島、南九十九島 | 渦鞭毛藻 | Karenia | mikimotoi | 無 | 不明 | 3,375 | 不明 |
| | SA-07 | 7/10～8/18 | (40日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾 | 渦鞭毛藻 | Karenia | mikimotoi | 無 | 42 | 2,230 | 不明 |
| | NS-06 | 7/11～8/4 | (25日間) | 九州西部(その他(中)) | 長崎市多良町地先 | 渦鞭毛藻 | Karenia | mikimotoi | 無 | 不明 | 6,350 | 不明 |
| | SA-08 | 7/15～7/24 | (10日間) | 九州北部(その他) | 唐津湾 | 渦鞭毛藻 | Karenia | mikimotoi | 有 | 42 | 2,000 | 不明 |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|------|-------|-----------|--------|--------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| | NS-07 | 7/16～8/8 | (24日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾南東～中央部 | 渦鞭毛藻 | <i>Karenia</i> | <i>mikimotoi</i> | 無 | 24 | 17,800 | 不明 |
| | NS-08 | 7/16～7/25 | (10日間) | 九州西部(その他(北)) | 佐世保市、楠泊地先、九十九島、北九十九島 | 渦鞭毛藻 | <i>Karenia</i> | <i>mikimotoi</i> | 無 | 不明 | 15,400 | 不明 |
| | KM-11 | 7/16～9/29 | (76日間) | 九州西部(八代海) | 天草市楠浦地先 | 渦鞭毛藻 | <i>Karenia</i> | <i>mikimotoi</i> | 無 | 42 | 8,000 | 不明 |
| | NS-09 | 7/30～8/18 | (20日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾南東部 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 無 | 42 | 456 | 不明 |
| | NS-10 | 7/31～9/18 | (50日間) | 九州西部(有明海) | 諫早湾～南島原市口之津地先 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 無 | 不明 | 1,980 | 不明 |
| | SA-09 | 7/31～8/12 | (13日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | <i>antiqua</i> | 有 | 42 | 500 | 不明 |
| R7.8 | SA-10 | 8/7～8/12 | (6日間) | 九州西部(有明海) | 白石町から塩田川河口域と太良町地先 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 無 | 45 | 190 | 不明 |
| | NS-11 | 8/8～8/13 | (6日間) | 九州西部(その他(北)) | 佐世保市、楠泊地先、九十九島、北九十九島 | 渦鞭毛藻 | <i>Gonyaulax</i> | <i>polygramma</i> | 無 | 不明 | 6,400 | 不明 |
| | SA-11 | 8/12～8/18 | (7日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾 | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | spp. (笠沙型) | 無 | 42 | 640 | 不明 |
| | SA-12 | 8/12～9/22 | (42日間) | 九州西部(有明海) | 川副町地先から竹崎沖 | 渦鞭毛藻 | <i>Akashiwo</i> | <i>sanguinea</i> | 無 | 33 | 552 | 不明 |
| | KM-12 | 8/12～9/29 | (49日間) | 九州西部(八代海) | 八代海 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 有 | 33,42 | 1,200 | 不明 |
| | F0-06 | 8/13～8/19 | (7日間) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾全域 | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 無 | 36 | 25,650 | 不明 |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| | FO-07 | 8/13～9/11 | (30日間) | 九州西部(有明海) | 福岡県海域 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 無 | 27, 33, 36, 42, 45, 54 | 5, 830 | 不明 |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Ceratium</i> | <i>fusus</i> | 無 | 27, 33 | 171 | |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Ceratium</i> | <i>furca</i> | 無 | 27, 33 | 350 | |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Akashiwo</i> | <i>sanguinea</i> | 無 | 27, 33, 36, 42, 45, 54 | 560 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 無 | 27, 33, 36, 42, 45, 54 | 38, 080 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 無 | 27, 33 | 7, 380 | |
| | KG-03 | 8/13～9/25 | (44日間) | 九州西部(八代海) | 長島町沖 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | <i>antiqua</i> | 無 | 不明 | 20, 000 | 不明 |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Karenia</i> | <i>mikimotoi</i> | 無 | 不明 | 25, 000 | 不明 |
| | | | | | | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | spp. (笠沙型) | 無 | 不明 | 600 | |
| | KM-13 | 8/15～8/28 | (14日間) | 九州西部(八代海) | 八代海 | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 無 | 42, 51 | 24, 000 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 無 | | 20, 000 | |
| | KM-14 | 8/19～9/22 | (35日間) | 九州西部(有明海) | 有明海 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 無 | 33, 42 | 1, 100 | 不明 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | SA-13 | 8/25～9/12 | (19日間) | 九州西部(有明海) | 川副町地先から鹿島市地先 | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | spp. | 有 | 42, 45 | 790 | 不明 |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|-------|-------|-------------|--------|--------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|---------|-------|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| R7. 9 | F0-08 | 9/3 ~ 9/30 | (28日間) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾全域 | 珪藻 | <i>Leptocylindrus</i> | spp. | 無 | 36 | 6,300 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Pseudo-nitzschia</i> | spp. | 無 | | 4,550 | |
| | KG-04 | 9/3 ~ 9/18 | (16日間) | 九州南部(その他) | 大島(奄美諸島) | ラフィド藻 | <i>Chattonella</i> | sp. | 不明 | 不明 | 10,000 | 不明 |
| | F0-09 | 9/11 ~ | (継続中) | 九州西部(有明海) | 福岡県海域 | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 無 | 42,45 | 5,610 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 無 | 42 | 1,570 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Pleurosigma</i> | spp. | 無 | 42 | 930 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Coscinodiscus</i> | spp. | 無 | 45,54 | 40 | |
| | NS-12 | 9/11 ~ 9/25 | (15日間) | 九州西部(その他(北)) | 西海市、面高地先 | 渦鞭毛藻 | <i>Heterocapsa</i> | <i>circularisquama</i> | 無 | 不明 | 844 | 不明 |
| | NS-13 | 9/12 ~ 9/25 | (14日間) | 九州西部(大村湾) | 佐世保湾 | 渦鞭毛藻 | <i>Heterocapsa</i> | <i>circularisquama</i> | 無 | 不明 | 26,200 | 不明 |
| | SA-14 | 9/16 ~ 9/22 | (7日間) | 九州西部(有明海) | ほぼ全域 | 珪藻 | <i>Skeletonema</i> | spp. | 無 | 42,46 | 27,000 | 不明 |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Chaetoceros</i> | spp. | 無 | | 18,950 | |
| | | | | | | 珪藻 | <i>Thalassiosira</i> | spp. | 無 | | 21,150 | |

| 発生年月 | 整理番号 | 発生期間 | | 発生海域 | | 赤潮構成プランクトン | | | 漁業被害の有無 | 水色 | 最高細胞数(cells/ml) | 最大面積(km ²) |
|--------|-------|---------------|--------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------|----|-----------------|------------------------|
| | | 発生日～終息日 | 日数 | 海域区分 | 詳細 | 綱 | 属 | 種 | | | | |
| R7. 10 | KM-15 | 10/9 ~ 10/23 | (15日間) | 九州西部(その他(南)) | 天草市茂串湾 | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | sp. (笠沙型) | 無 | 不明 | 500 | 不明 |
| | KM-16 | 10/17 ~ 10/23 | (7日間) | 九州西部(八代海) | 宇城市松合地先 | ラフィド藻 | <i>Heterosigma</i> | <i>akashiwo</i> | 無 | 不明 | 6,500 | 不明 |
| R7. 11 | NS-14 | 11/5 ~ | (継続中) | 離島(五島) | 新上五島町、中通島西岸、若松瀬戸 | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | sp. (笠沙型) | 有 | 24 | 64,200 | 不明 |
| | KM-17 | 11/12 ~ 11/20 | (9日間) | 九州西部(有明海) | 玉名市横島地先～熊本港沖 | リトストマ(纖毛虫) | <i>Mesodinium</i> | <i>rubrum</i> | 無 | 15 | 1,600 | 不明 |
| | NS-15 | 11/14 ~ | (継続中) | 九州西部(その他(北)) | 佐世保市、小佐々町、焼島、矢岳地先、九十九島、北九十九島 | 渦鞭毛藻 | <i>Cochlodinium</i> | sp. (笠沙型) | 無 | 27 | 12,020 | 不明 |
| | KM-18 | 11/18 ~ | (継続中) | 九州西部(有明海) | 玉名市岱明地先～熊本市河内地先 | ラフィド藻 | <i>Heterosigma</i> | <i>akashiwo</i> | 無 | 33 | 17,000 | 不明 |
| | KM-19 | 11/21 ~ | (継続中) | 九州西部(八代海) | 宇城市戸馳島東～八代市大築島沖 | 珪藻 | <i>Eucampia</i> | <i>zodiacus</i> | 無 | 33 | 3,600 | 不明 |
| | FO-10 | 11/25 ~ | (継続中) | 九州北部(福岡湾) | 福岡湾東～中部 | ラフィド藻 | <i>Heterosigma</i> | <i>akashiwo</i> | 無 | 24 | 44,200 | 不明 |
| | SA-15 | 11/26 ~ | (継続中) | 九州西部(有明海) | 白石町地先 | リトストマ(纖毛虫) | <i>Mesodinium</i> | <i>rubrum</i> | 無 | 33 | 5,000 | 不明 |