

# 令和7年 九州海域における赤潮発生状況（12月分まで）

県名：まとめ

発生年月	整理番号	発生期間		発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日～終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
R6.10	NS-23	10/23～1/8	(78日間)	九州西部(その他(北))	南九十九島周辺	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	sp.(笠沙型)	無	不明	6,225	不明
R6.12	SA-10	12/9～1/16	(39日間)	九州西部(有明海)	川副町地先から鹿島市地先	渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	有	33	390	不明
R6.12	FO-12	12/25～4/28	(125日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有	45	3,070	不明
						珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有		26,550	
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有		3,740	
						珪藻	<i>Rhizosolenia</i>	<i>setigera</i>	有		60	
						渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	有		800	
R7.1	KM-01	1/8～3/28	(80日間)	九州西部(有明海)	熊本市港地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42,36	14,000	不明
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有		1,700	
	SA-01	1/16～4/28	(103日間)	九州西部(有明海)	筑後川河口域から太良町地先	珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有	44	6,540	不明
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有		3,222	
						珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有		10,544	
R7.3	KM-02	3/27～4/18	(23日間)	九州西部(八代海)	八代海湾奥部～球磨川河口	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	無	42,51	850	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
R7.4	YG-01	4/12 ~ 4/12	(1日間)	九州北部(その他)	下関外海～萩沖	渦鞭毛藻	<i>Noctiluca</i>	<i>scintillans</i>	無	不明	不明	不明
	KG-01	4/19 ~ 5/30	(42日間)	離島(甌島)	薩摩川内市上甌町浦内湾	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	<i>polykrikoides</i>	不明	不明	1,505	不明
	YG-02	4/21 ~ 5/7	(17日間)	九州北部(その他)	油谷湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>digitata</i>	無	不明	723	不明
	KM-03	4/21 ~ 5/12	(22日間)	九州西部(八代海)	八代市鏡町地先、天草市久玉地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	16,000	不明
	KM-04	4/23 ~ 5/27	(35日間)	九州西部(有明海)	荒尾市地先～熊本市河内地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42,51	24,000	不明
	YG-03	4/24 ~ 4/24	(1日間)	九州北部(その他)	仙崎湾	渦鞭毛藻	<i>Gymnodinium</i>	sp.	無	不明	29,400	不明
R7.5	KM-05	5/14 ~ 6/4	(22日間)	九州西部(八代海)	宇城市大岳地先～八代市鏡町地先、上天草市龍ヶ岳地先、天草市嵐口地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	33,42,51	130,000	不明
	FO-01	5/15 ~ 5/20	(6日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾東～中部沿岸海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	36	40,900	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無		30,450	
	FO-02	5/15 ~ 5/27	(13日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	45	15,020	不明
	SA-02	5/15 ~ 5/27	(13日間)	九州西部(有明海)	白石町から太良町地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	32	10,550	不明
	MZ-01	5/19 ~ 5/26	(8日間)	九州東部(北部)	北浦湾周辺海域	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	79,000	不明
	KG-02	5/20 ~ 5/28	(9日間)	九州南部(鹿児島湾)	鹿児島湾奥	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	115,000	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	NS-01	5/21 ~ 5/26	(6日間)	離島(奄岐)	奄岐市芦辺町沿岸	渦鞭毛藻	<i>Noctiluca</i>	<i>scintillans</i>	無	13	305	不明
	FO-03	5/29 ~ 6/2	(5日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾東～中部沿岸海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	27	191,800	不明
R7.6	KM-06	6/2 ~ 9/1	(92日間)	九州西部(有明海)	有明海	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42, 51	24,000	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無		20,000	
	SA-03	6/3 ~ 6/12	(10日間)	九州西部(有明海)	白石町から太良町地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	45	12,300	不明
	KM-07	6/4 ~ 7/10	(37日間)	九州西部(八代海)	宇城市戸馳島東～八代市大築島北	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42, 51	26,000	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無		9,300	
	FO-04	6/9 ~ 6/18	(10日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾中南部沿岸海域	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	有	24, 33	27,300	不明
	MZ-02	6/10 ~ 6/12	(3日間)	九州東部(北部)	北浦湾周辺海域	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	13,000	不明
	NS-02	6/12 ~ 6/26	(15日間)	離島(五島)	五島市玉之浦湾	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	<i>polykrikoides</i>	無	不明	397	不明
	KM-08	6/16 ~ 6/30	(15日間)	九州西部(八代海)	天草市久玉地先	リトストマ(繊毛虫)	<i>Mesodinium</i>	<i>rubrum</i>	無	不明	4,800	不明
	SA-04	6/17 ~ 6/25	(9日間)	九州西部(有明海)	白石町から竹崎沖	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	spp.	無	33	6,100	不明
	SA-05	6/17 ~ 6/25	(9日間)	九州西部(有明海)	白石町から太良町地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	33	6,100	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	KM-09	6/17 ~ 8/12	(57日間)	九州西部(八代海)	八代海	渦鞭毛藻	<i>Gonyaulax</i>	<i>polygramma</i>	無	16	34,000	不明
	FO-05	6/19 ~ 6/25	(7日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	15	16,480	不明
						渦鞭毛藻	<i>Gyrodinium</i>	spp.	無		10,360	
						渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	spp.	無		7,380	
	NS-03	6/23 ~ 7/29	(37日間)	九州西部(橘湾)	橘湾中央部及び長崎市網場～諫早市～雲仙市千々石地先	渦鞭毛藻	<i>Gonyaulax</i>	<i>polygramma</i>	無	15	9,300	不明
	SA-06	6/30 ~ 7/15	(16日間)	九州北部(その他)	唐津湾	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	<i>antiqua</i>	無	33	1,440	不明
R7.7	NS-04	7/2 ~ 7/16	(15日間)	九州西部(大村湾)	佐世保湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	33	1,460	不明
	KM-10	7/4 ~ 8/5	(33日間)	九州西部(その他(南))	天草市魚貫崎沖	渦鞭毛藻	<i>Gonyaulax</i>	<i>polygramma</i>	無	不明	32,000	不明
	NS-05	7/9 ~ 8/6	(29日間)	九州西部(その他(北))	佐世保市、鹿子前～白馬地先、九十九島、南九十九島	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	3,375	不明
	SA-07	7/10 ~ 8/18	(40日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	42	2,230	不明
	NS-06	7/11 ~ 8/4	(25日間)	九州西部(その他(中))	長崎市多以良町地先	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	6,350	不明
	SA-08	7/15 ~ 7/24	(10日間)	九州北部(その他)	唐津湾	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	有	42	2,000	不明
	NS-07	7/16 ~ 8/8	(24日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾南東～中央部	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	24	17,800	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	NS-08	7/16 ~ 7/25	(10日間)	九州西部(その他(北))	佐世保市、楠泊地先、九十九島、北九十九島	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	15,400	不明
	KM-11	7/16 ~ 9/29	(76日間)	九州西部(八代海)	天草市楠浦地先	渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	42	8,000	不明
	NS-09	7/30 ~ 8/18	(20日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾南東部	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	42	456	不明
	NS-10	7/31 ~ 9/18	(50日間)	九州西部(有明海)	諫早湾～南島原市口之津地先	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	不明	1,980	不明
	SA-09	7/31 ~ 8/12	(13日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	<i>antiqua</i>	有	42	500	不明
R7.8	SA-10	8/7 ~ 8/12	(6日間)	九州西部(有明海)	白石町から塩田川河口域と太良町地先	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	45	190	不明
	NS-11	8/8 ~ 8/13	(6日間)	九州西部(その他(北))	佐世保市、楠泊地先、九十九島、北九十九島	渦鞭毛藻	<i>Gonyaulax</i>	<i>polygramma</i>	無	不明	6,400	不明
	SA-11	8/12 ~ 8/18	(7日間)	九州北部(伊万里湾)	伊万里湾	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	spp. (笠沙型)	無	42	640	不明
	SA-12	8/12 ~ 9/22	(42日間)	九州西部(有明海)	川副町地先から竹崎沖	渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	無	33	552	不明
	KM-12	8/12 ~ 9/29	(49日間)	九州西部(八代海)	八代海	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	有	33, 42	1,200	不明
	FO-06	8/13 ~ 8/19	(7日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾全域	珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無	36	25,650	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
	FO-07	8/13 ~ 9/11	(30日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	27, 33, 36, 42, 45, 54	5, 830	不明
						渦鞭毛藻	<i>Ceratium</i>	<i>fusus</i>	無	27, 33	171	
						渦鞭毛藻	<i>Ceratium</i>	<i>furca</i>	無	27, 33	350	
						渦鞭毛藻	<i>Akashiwo</i>	<i>sanguinea</i>	無	27, 33, 36, 42, 45, 54	560	
						珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	27, 33, 36, 42, 45, 54	38, 080	
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無	27, 33	7, 380	
	KG-03	8/13 ~ 9/25	(44日間)	九州西部(八代海)	長島町沖	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	<i>antiqua</i>	無	不明	20, 000	不明
						渦鞭毛藻	<i>Karenia</i>	<i>mikimotoi</i>	無	不明	25, 000	不明
						渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	spp. (笠沙型)	無	不明	600	
	KM-13	8/15 ~ 8/28	(14日間)	九州西部(八代海)	八代海	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42, 51	24, 000	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無		20, 000	
	KM-14	8/19 ~ 9/22	(35日間)	九州西部(有明海)	有明海	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	無	33, 42	1, 100	不明
	SA-13	8/25 ~ 9/12	(19日間)	九州西部(有明海)	川副町地先から鹿島市地先	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	spp.	有	42, 45	790	不明

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
R7.9	F0-08	9/3 ~ 9/30	(28日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾全域	珪藻	<i>Leptocylinthus</i>	spp.	無	36	6,300	不明
						珪藻	<i>Pseudo-nitzschia</i>	spp.	無		4,550	
	KG-04	9/3 ~ 9/18	(16日間)	九州南部(その他)	大島 (奄美諸島)	ラフィド藻	<i>Chattonella</i>	sp.	不明	不明	10,000	不明
	F0-09	9/11 ~ 12/11	(92日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42, 45	5,610	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有	42	1,570	
						珪藻	<i>Pleurosigma</i>	spp.	有	42	930	
						珪藻	<i>Coscinodiscus</i>	spp.	有	45, 54	40	
	NS-12	9/11 ~ 9/25	(15日間)	九州西部(その他(北))	西海市、面高地先	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	<i>circularisquama</i>	無	不明	844	不明
	NS-13	9/12 ~ 9/25	(14日間)	九州西部(大村湾)	佐世保湾	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	<i>circularisquama</i>	無	不明	26,200	不明
	SA-14	9/16 ~ 9/22	(7日間)	九州西部(有明海)	ほぼ全域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	無	42, 46	27,000	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	無		18,950	
						珪藻	<i>Thalassiosira</i>	spp.	無		21,150	

発生 年月	整理 番号	発 生 期 間		発 生 海 域		赤潮構成プランクトン			漁業被害 の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km <sup>2</sup> )
		発生日 ~ 終息日	日 数	海域区分	詳 細	綱	属	種				
R7. 10	KM-15	10/9 ~ 10/23	(15日間)	九州西部(その他(南))	天草市茂串湾	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	sp. (笠沙型)	無	不明	500	不明
	KM-16	10/17 ~ 10/23	(7日間)	九州西部(八代海)	宇城市松合地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	不明	6,500	不明
R7. 11	NS-14	11/5 ~ 12/3	(29日間)	離島(五島)	新上五島町、中通島西岸、若松瀬戸	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	sp. (笠沙型)	有	24	64,200	不明
	KM-17	11/12 ~ 11/20	(9日間)	九州西部(有明海)	玉名市横島地先～熊本港沖	リトストマ(繊毛虫)	<i>Mesodinium</i>	<i>rubrum</i>	無	15	1,600	不明
	NS-15	11/14 ~ 12/4	(21日間)	九州西部(その他(北))	佐世保市、小佐々町、焼島、矢岳地先、九十九島、北九十九島	渦鞭毛藻	<i>Cochlodinium</i>	sp. (笠沙型)	無	27	12,020	不明
	KM-18	11/18 ~ 12/2	(15日間)	九州西部(有明海)	玉名市岱明地先～熊本市河内地先	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	33	17,000	不明
	KM-19	11/21 ~	(継続中)	九州西部(八代海)	宇城市戸馳島東～八代市大築島沖	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	無	33	3,600	不明
	FO-10	11/25 ~ 12/1	(7日間)	九州北部(福岡湾)	福岡湾東～中部	ラフィド藻	<i>Heterosigma</i>	<i>akashiwo</i>	無	24	44,200	不明
	SA-15	11/26 ~ 12/2	(7日間)	九州西部(有明海)	白石町地先	リトストマ(繊毛虫)	<i>Mesodinium</i>	<i>rubrum</i>	無	33	5,000	不明
R7. 12	YG-04	12/1 ~ 12/1	(1日間)	九州北部(その他)	奈古漁港内	リトストマ(繊毛虫)	<i>Mesodinium</i>	<i>rubrum</i>	無	不明	1,425	不明
	KM-20	12/2 ~	(継続中)	九州西部(有明海)	玉名市岱明地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	36	19,000	不明
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有		130	
	KM-21	12/19 ~	(継続中)	九州西部(八代海)	天草市楠浦湾	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	<i>circularisquama</i>	有	42	1,600	不明