

令和8年 九州海域における赤潮発生状況（1～3月）

県名：まとめ

発生年月	整理番号	発生期間		発生海域		赤潮構成プランクトン			漁業被害の有無	水色	最高細胞数 (cells/ml)	最大面積 (km ²)
		発生日～終息日	日数	海域区分	詳細	綱	属	種				
R7.11	KM-19	11/21～1/5	(46日間)	九州西部(八代海)	八代海	珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	無	33	3,600	不明
R7.12	KM-20	12/2～3/19	(108日間)	九州西部(有明海)	玉名市岱明地先～宇土市赤瀬沖	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	36	25,000	不明
						珪藻	<i>Eucampia</i>	<i>zodiacus</i>	有		700	
	KM-21	12/19～3/4	(76日間)	九州西部(八代海)	天草市楠浦湾	渦鞭毛藻	<i>Heterocapsa</i>	<i>circularisquama</i>	有	42	2,000	不明
R8.1	SA-01	1/5～1/26	(22日間)	九州西部(有明海)	六角川河口域から白石町地先	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42	18,266	不明
	FO-01	1/30～3/23	(53日間)	九州西部(有明海)	福岡県海域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	42, 45	2,890	不明
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有		1,360	
						珪藻	<i>Rhizosolenia</i>	<i>setigera</i>	有		140	
SA-02	1/30～3/3	(33日間)	九州西部(有明海)	ほぼ全域	珪藻	<i>Skeletonema</i>	spp.	有	45	21,600	不明	
						珪藻	<i>Chaetoceros</i>	spp.	有		6,520	
R8.2	KM-01	2/12～2/27	(16日間)	九州西部(八代海)	天草市宮野河内地先	渦鞭毛藻	<i>Alexandrium</i>	<i>pacificum</i>	無	不明	2,300	不明