

# 令和8年 九州海域における赤潮発生状況（1～7月）

県名：まとめ

| 発生年月  | 整理番号  | 発 生 期 間   |         | 発 生 海 域   |                     | 赤潮構成プランクトン |                     |                        | 漁業被害の有無 | 水色    | 最高細胞数<br>(cells/ml) | 最大面積<br>(km <sup>2</sup> ) |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|---------|-------|---------------------|----------------------------|
|       |       | 発生日～終息日   | 日数      | 海域区分      | 詳細                  | 綱          | 属                   | 種                      |         |       |                     |                            |
| R7.11 | KM-19 | 11/21～1/5 | (46日間)  | 九州西部(八代海) | 八代海                 | 珪藻         | <i>Eucampia</i>     | <i>zodiacus</i>        | 無       | 33    | 3,600               | 不明                         |
| R7.12 | KM-20 | 12/2～3/19 | (108日間) | 九州西部(有明海) | 玉名市岱明地先～宇土市赤瀬沖      | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>  | spp.                   | 有       | 36    | 25,000              | 不明                         |
|       |       |           |         |           |                     | 珪藻         | <i>Eucampia</i>     | <i>zodiacus</i>        | 有       |       | 700                 |                            |
|       | KM-21 | 12/19～3/4 | (76日間)  | 九州西部(八代海) | 天草市楠浦湾              | 渦鞭毛藻       | <i>Heterocapsa</i>  | <i>circularisquama</i> | 有       | 42    | 2,000               | 不明                         |
| R8.1  | SA-01 | 1/5～1/26  | (22日間)  | 九州西部(有明海) | 六角川河口域から白石町地先       | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>  | spp.                   | 有       | 42    | 18,266              | 不明                         |
|       | FO-01 | 1/30～3/23 | (53日間)  | 九州西部(有明海) | 福岡県海域               | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>  | spp.                   | 有       | 42,45 | 2,890               | 不明                         |
|       |       |           |         |           |                     | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i>  | spp.                   | 有       |       | 1,360               |                            |
|       |       |           |         |           |                     | 珪藻         | <i>Rhizosolenia</i> | <i>setigera</i>        | 有       |       | 140                 |                            |
|       | SA-02 | 1/30～3/3  | (33日間)  | 九州西部(有明海) | ほぼ全域                | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>  | spp.                   | 有       | 45    | 21,600              | 不明                         |
|       |       |           |         |           |                     | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i>  | spp.                   | 有       |       | 6,520               |                            |
| R8.2  | KM-01 | 2/12～2/27 | (16日間)  | 九州西部(八代海) | 天草市宮野河内地先           | 渦鞭毛藻       | <i>Alexandrium</i>  | <i>pacificum</i>       | 無       | 不明    | 2,300               | 不明                         |
| R8.4  | KM-02 | 4/9～5/7   | (29日間)  | 九州西部(八代海) | 八代市鏡地先～八代市大島、天草市浅海湾 | ラフィド藻      | <i>Heterosigma</i>  | <i>akashiwo</i>        | 無       | 不明    | 216,000             | 不明                         |

| 発生<br>年月 | 整理<br>番号 | 発 生 期 間     |        | 発 生 海 域    |                | 赤潮構成プランクトン |                        |                      | 漁業被害<br>の有無 | 水色 | 最高細胞数<br>(cells/ml) | 最大面積<br>(km <sup>2</sup> ) |
|----------|----------|-------------|--------|------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|-------------|----|---------------------|----------------------------|
|          |          | 発生日 ~ 終息日   | 日 数    | 海域区分       | 詳 細            | 綱          | 属                      | 種                    |             |    |                     |                            |
|          | YG-01    | 4/11 ~ 4/11 | (1日間)  | 九州北部(その他)  | 奈古湾            | 渦鞭毛藻       | <i>Gymnodinium</i>     | sp.                  | 無           | 不明 | 数千                  | 不明                         |
|          | KM-03    | 4/15 ~ 4/22 | (8日間)  | 九州西部(八代海)  | 上天草市野釜島南沖      | 渦鞭毛藻       | <i>Noctiluca</i>       | <i>scintillans</i>   | 無           | 不明 | 310                 | 不明                         |
|          | YG-02    | 4/20 ~ 4/20 | (1日間)  | 九州北部(その他)  | 紫津浦湾           | 渦鞭毛藻       | <i>Gymnodinium</i>     | sp.                  | 無           | 不明 | 数千                  | 不明                         |
|          | NS-01    | 4/24 ~ 6/19 | (57日間) | 九州西部(大村湾)  | 佐世保湾           | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>         | <i>mikimotoi</i>     | 無           | 33 | 1,940               | 不明                         |
| R8.5     | NS-02    | 5/5 ~ 7/22  | (79日間) | 離島(五島)     | 五島市玉之浦湾        | 渦鞭毛藻       | <i>Margalefidinium</i> | <i>polykrikoides</i> | 有           | 不明 | 2,013               | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>         | <i>mikimotoi</i>     | 無           | 不明 | 410                 | 不明                         |
|          | KM-04    | 5/8 ~ 6/16  | (40日間) | 九州西部(八代海)  | 八代市八代内港        | ラフィド藻      | <i>Heterosigma</i>     | <i>akashiwo</i>      | 無           | 不明 | 30,000              | 不明                         |
|          | KM-05    | 5/20 ~ 6/15 | (27日間) | 九州西部(有明海)  | 熊本市松尾地先        | ラフィド藻      | <i>Heterosigma</i>     | <i>akashiwo</i>      | 無           | 不明 | 50,000              | 不明                         |
|          | SA-03    | 5/21 ~ 7/2  | (43日間) | 九州北部(伊万里湾) | 佐賀県伊万里市波多津町辻地先 | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>         | <i>mikimotoi</i>     | 無           | 42 | 15,784              | 不明                         |
|          | NS-03    | 5/22 ~ 6/22 | (32日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾           | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>         | <i>mikimotoi</i>     | 無           | 不明 | 1,810               | 不明                         |
|          | YG-03    | 5/29 ~ 6/11 | (14日間) | 九州北部(その他)  | 津黄漁港           | ラフィド藻      | <i>Heterosigma</i>     | <i>akashiwo</i>      | 無           | 不明 | 39,700              | 不明                         |
| R8.6     | KG-01    | 6/3 ~ 6/19  | (17日間) | 九州南部(鹿児島湾) | 鹿児島湾奥          | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>     | <i>marina</i>        | 有           | 42 | 4,985               | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                | 渦鞭毛藻       | <i>Dictyocha</i>       | <i>fibula</i>        | 有           | 42 | 2,000               | 不明                         |

| 発生<br>年月 | 整理<br>番号 | 発 生 期 間     |        | 発 生 海 域    |                 | 赤潮構成プランクトン |                      |                   | 漁業被害<br>の有無 | 水色             | 最高細胞数<br>(cells/ml) | 最大面積<br>(km <sup>2</sup> ) |
|----------|----------|-------------|--------|------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------|
|          |          | 発生日 ~ 終息日   | 日 数    | 海域区分       | 詳 細             | 綱          | 属                    | 種                 |             |                |                     |                            |
|          | NS-04    | 6/4 ~ 6/12  | (9日間)  | 九州西部(大村湾)  | 大村湾北西部          | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>       | <i>mikimotoi</i>  | 無           | 不明             | 2,250               | 不明                         |
|          | KG-02    | 6/15 ~      | (継続中)  | 九州西部(八代海)  | 長島町沖            | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>   | <i>antiqua</i>    | 有           | 42             | 15,000              | 不明                         |
|          | KM-06    | 6/16 ~      | (継続中)  | 九州西部(八代海)  | 八代海全域           | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>   | spp.              | 有           | 24、32、33、36、42 | 3,200               | 不明                         |
|          | NS-05    | 6/19 ~ 6/24 | (6日間)  | 九州西部(橘湾)   | 長崎市網場町～諫早市飯盛町地先 | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>       | <i>mikimotoi</i>  | 無           | 不明             | 1,450               | 不明                         |
|          | SA-04    | 6/22 ~ 6/30 | (9日間)  | 九州西部(有明海)  | 塩田川河口域から太良町地先   | クリプト藻      | 微細藻類                 |                   | 無           | 33,45          | 12,900              | 不明                         |
|          | NS-06    | 6/26 ~ 7/17 | (22日間) | 九州北部(伊万里湾) | 伊万里湾            | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>   | spp.              | 無           | 24             | 4,600               | 不明                         |
|          | NS-07    | 6/28 ~ 7/8  | (11日間) | 離島(五島)     | 新上五島町若松瀬戸       | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>       | <i>mikimotoi</i>  | 無           | 不明             | 18,000              | 不明                         |
|          | FO-02    | 6/29 ~ 7/7  | (9日間)  | 九州北部(福岡湾)  | 福岡湾全域           | 珪藻         | <i>Thalassiosira</i> | spp.              | 無           | 42             | 17,000              | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                 | 渦鞭毛藻       | <i>Prorocentrum</i>  | <i>triestinum</i> | 無           | 42             | 1,700               | 不明                         |
|          | FO-03    | 6/30 ~ 7/7  | (8日間)  | 九州西部(有明海)  | 福岡県海域           | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>   | spp.              | 無           | 36,45          | 52,150              | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                 | 珪藻         | <i>Thalassiosira</i> | spp.              | 無           | 36,45          | 9,980               | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                 | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i>   | spp.              | 無           | 36,45          | 1,930               | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                 | 渦鞭毛藻       | <i>Akashiwo</i>      | <i>sanguinea</i>  | 無           | 36,45          | 90                  | 不明                         |

| 発生<br>年月 | 整理<br>番号 | 発 生 期 間     |        | 発 生 海 域    |                           | 赤潮構成プランクトン |                      |                    | 漁業被害<br>の有無 | 水色             | 最高細胞数<br>(cells/ml) | 最大面積<br>(km <sup>2</sup> ) |
|----------|----------|-------------|--------|------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------|
|          |          | 発生日 ~ 終息日   | 日 数    | 海域区分       | 詳 細                       | 綱          | 属                    | 種                  |             |                |                     |                            |
|          | SA-05    | 6/30 ~ 7/21 | (22日間) | 九州西部(有明海)  | 川副町地先から大浦沖                | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>   | spp.               | 無           | 33, 45         | 26, 650             | 不明                         |
| R8. 7    | SA-06    | 7/2 ~       | (継続中)  | 九州北部(伊万里湾) | 佐賀県唐津市肥前町大浦地先～伊万里市波多津町辻地先 | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>   | spp.               | 無           | 33             | 1, 656              | 不明                         |
|          | NS-08    | 7/3 ~ 7/17  | (15日間) | 九州西部(大村湾)  | 佐世保湾                      | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>       | <i>digitata</i>    | 無           | 33             | 2, 930              | 不明                         |
|          | KM-07    | 7/3 ~ 7/7   | (5日間)  | 九州西部(八代海)  | 宇城市戸馳島東から八代市大築島北          | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>   | spp.               | 無           | 24, 32, 33, 42 | 3, 800              | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                           | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i>   | spp.               | 無           | 24, 32, 33, 42 | 1, 800              | 不明                         |
|          | FO-04    | 7/9 ~ 8/4   | (27日間) | 九州西部(有明海)  | 福岡県海域                     | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>   | spp.               | 無           | 33、42          | 69, 090             | 不明                         |
|          |          |             |        | 九州西部(有明海)  | 福岡県海域                     | 渦鞭毛藻       | <i>Heterocapsa</i>   | spp.               | 無           | 33、42          | 960                 | 不明                         |
|          | NS-09    | 7/9 ~       | (継続中)  | 九州西部(有明海)  | 諫早湾                       | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i>   | spp.               | 無           | 15             | 17, 500             | 不明                         |
|          | KM-08    | 7/10 ~ 7/16 | (7日間)  | 九州西部(八代海)  | 宇城市戸馳島東から上天草市姫戸沖          | 珪藻         | <i>Skeletonema</i>   | spp.               | 無           | 24, 32, 33, 42 | 5, 000              | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                           | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i>   | spp.               | 無           | 24, 32, 33, 42 | 2, 300              | 不明                         |
|          |          |             |        |            |                           | 珪藻         | <i>Thalassiosira</i> | spp.               | 無           | 24, 32, 33, 42 | 6, 100              | 不明                         |
|          | KM-09    | 7/10 ~ 7/16 | (7日間)  | 九州西部(八代海)  | 天草市楠浦湾                    | 渦鞭毛藻       | <i>Noctiluca</i>     | <i>scintillans</i> | 無           | 不明             | 不明                  | 不明                         |

| 発生<br>年月 | 整理<br>番号 | 発 生 期 間     |       | 発 生 海 域      |                        | 赤潮構成プランクトン |                    |                  | 漁業被害<br>の有無 | 水色                | 最高細胞数<br>(cells/ml) | 最大面積<br>(km <sup>2</sup> ) |
|----------|----------|-------------|-------|--------------|------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|          |          | 発生日 ～ 終息日   | 日 数   | 海域区分         | 詳 細                    | 綱          | 属                  | 種                |             |                   |                     |                            |
|          | NS-10    | 7/13 ～      | (継続中) | 九州西部(橘湾)     | 橘湾南串山地先                | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i> | spp.             | 無           | 不明                | 47                  | 不明                         |
|          |          |             |       |              |                        | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>     | <i>mikimotoi</i> | 無           | 不明                | 4,450               | 不明                         |
|          | KM-10    | 7/14 ～      | (継続中) | 九州西部(有明海)    | 有明海全域                  | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i> | spp.             | 無           | 33, 34, 42        | 1,500               | 不明                         |
|          | NS-11    | 7/17 ～      | (継続中) | 九州西部(橘湾)     | 長崎市網場町～諫早市飯盛町地先        | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>     | <i>mikimotoi</i> | 無           | 不明                | 770                 | 不明                         |
|          | FO-05    | 7/21 ～      | (継続中) | 九州西部(有明海)    | 福岡県海域                  | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i> | spp.             | 無           | 24、32、33、36、42、45 | 5,650               | 不明                         |
|          | SA-07    | 7/21 ～      | (継続中) | 九州西部(有明海)    | ほぼ全域                   | ラフィド藻      | <i>Chattonella</i> | spp.             | 有           | 33、42、45          | 2,562               | 不明                         |
|          | NS-12    | 7/21 ～      | (継続中) | 九州西部(その他(北)) | 佐世保市小佐々町楠泊地先、九十九島北九十九島 | 渦鞭毛藻       | <i>Karenia</i>     | <i>mikimotoi</i> | 無           | 不明                | 1,840               | 不明                         |
|          | NS-13    | 7/23 ～      | (継続中) | 離島(対馬)       | 浅茅湾美津島町大山地先            | 渦鞭毛藻       | <i>Fragilidium</i> | sp.              | 無           | 34                | 6,433               | 不明                         |
|          | KM-11    | 7/24 ～ 7/30 | (7日間) | 九州西部(八代海)    | 宇城市戸馳島東から八代市大築島北       | 珪藻         | 珪藻類                |                  | 無           | 24, 32, 33, 42    | 1,900               | 不明                         |
|          | SA-08    | 7/31 ～      | (継続中) | 九州西部(有明海)    | 白石町地先                  | 珪藻         | <i>Chaetoceros</i> | spp.             | 無           | 33                | 10,440              | 不明                         |